

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 2-7-68 798948

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE" Arras - Tél. 21.04.21
(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE - SEINE-MARITIME)

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

Régisseur de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 13, Grand'Place - 62 - ARRAS
C.C.P. LILLE 5701-50

Supplément n° 2 au n° 93
26 juin 1968

AVERTISSEMENTS

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

GRANDES CULTURES

Dans la pratique, les averses souvent abondantes et violentes qui sont tombées le 19 juin sur un grand nombre de régions ont empêché toute intervention immédiate dans les cultures. Il n'a donc pas été matériellement possible d'assurer une protection aussi efficace qu'il eut été souhaitable.

Cependant les traitements réalisés en fin de semaine dernière (le 22 juin par exemple) doivent permettre de contrôler en grande partie l'extension de l'épidémie qui a pu se manifester actuellement dans les régions fortement arrosées.

En cette période prépondérante dans l'évolution de la maladie, les dates d'intervention et de renouvellement des traitements doivent tenir compte de la dégradation des produits (lessivage sous les pluies notamment) mais aussi de la croissance de nouveaux organes verts. L'efficacité des traitements peut être ainsi rapidement diminuée, ce qui nécessite quelquefois de renouveler les traitements dans des délais assez brefs.

Les dernières pluies ont assuré de nouvelles contaminations graves les 20 et 23 juin notamment, une nouvelle progression de la maladie peut être envisagée en fin de mois.

Il sera prudent de réaliser un nouveau traitement généralisé sur l'ensemble des cultures du 29 juin au 2 juillet. Ce traitement pourra être étendu aux variétés féculières.

RENOUVELEMENT DES TRAITEMENTS APRES UNE FORTE PLUIE

"Il est difficile de fixer exactement la durée de persistance d'un produit sous la pluie. Cette durée dépend de l'adhésivité du produit, de la solubilité de la matière active et bien entendu de l'importance de la précipitation. Les deux premiers éléments ne peuvent être précisés que par les fabricants.

En ce qui concerne la pluie, on admet généralement qu'une forte pluie d'orage (15 à 20 m/m d'eau obtenue en 15 à 30 minutes) ou une pluie fine mais continue pendant une dizaine d'heures peuvent entraîner un lessivage préjudiciable à l'efficacité du traitement lorsqu'il s'agit d'un produit d'adhésivité moyenne. Le renouvellement du traitement s'impose donc chaque fois que l'on a enregistré de telles précipitations.

Il est bon de préciser qu'un traitement fongicide s'accommode plus difficilement d'un lessivage partiel qu'un traitement insecticide."

CARPOCAPSE DES FRUITS A PEPINS

CULTURES FRUITIERES

L'activité de ce papillon a quelquefois été réduite par des conditions climatiques défectueuses au moment du vol. Cependant des éclosions peuvent se manifester dans la 1^{re} décade de juillet. Maintenir une bonne protection au cours de cette période dans les vergers sensibles à ce ravageur et situés en secteurs chauds.

Le Contrôleur
G. CONCE

L'Inspecteur
P. COUTURIER